Fluxograma: Manejo da intoxicação por metanol pelo consumo de bebidas alcoólicas adulteradas

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CASO SUSPEITO:

Indivíduo que ingeriu bebida destilada e apresentou **PERSISTÊNCIA** ou **PIORA** dos sintomas entre 6h a 72 horas após a ingestão. Apresentam sintomas gastrointestinais e do sistema nervoso central: náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, geralmente de forte intensidade, confusão, vertigem, amaurose, borramento visual, midríase.

Observação:

Pacientes com baixa ingesta podem levar mais tempo para apresentar sintomas e evoluir de forma grave com acometimento e sequelas em órgãos alvo, com destaque para quadros neurológicos e renais.

MNEMÔNICO PARA GRAVAR:

- M** Medir ânion gap e gap osmolar
- E** Etanol e fomepizol - antídotos
- T** Tratamento sintomático e de suporte
- A** Alcalinizar com bicarbonato
- N** Nefro - Hemodiálise
- O** Olho - sintomas visuais / avaliação oftálmica
- L** Ligar para o CIATox

Acesse aqui os telefones de contato dos CIATox:

Neste momento, contato com as Centrais de Regulação de Urgência (CRU) para transferência ao serviço de referência pactuado, com serviço de hemodiálise e Unidade de Terapia Intensiva.

Crítérios para leito de UTI:
Necessidade de tratamento com etanol; necessidade de monitorização rigorosa de dados vitais e laboratorial.
Necessidade de hemodiálise.
Alteração do nível de consciência: Glasgow <10 ou presença de convulsões;
Instabilidade hemodinâmica ou respiratória: Instabilidade dos sinais vitais com necessidade de uso de vasopressores, ou presença de insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório;
Acidose metabólica grave: pH arterial < 7,2, e ânion gap elevado (≥ 28 mEq/L) são fortemente associados a pior prognóstico e indicam necessidade de tratamento intensivo;
Comprometimento visual agudo: Perda visual súbita ou evidências de neuropatia óptica são manifestações graves e requerem monitorização neurológica intensiva;
Disfunção orgânica múltipla: evidência de disfunção de mais de um órgão ou sistema;
Arritmias cardíacas ou insuficiência renal aguda: A presença de arritmias ou elevação significativa da creatinina também são fatores de risco para mortalidade.

Crítérios para suspensão do tratamento (antídoto e hemodiálise):
Reversão sustentada da acidose metabólica após 12h;
OU
a concentração de metanol é indetectável; **OU**
a concentração de metanol é inferior a 20 mg/dL e a acidose e os sinais de toxicidade sistêmica foram resolvidos.

Monitoramento do tratamento:
Solicitar função renal, ions, gasometria arterial, hemograma, lactato, função hepática, enzimas pancreáticas, transaminases, e outros que forem necessários.
Reavaliação diária neurológica e oftalmológica por 3 dias.

Crítérios de alta
Caso leve (com sintomas, mas sem acidose ou ânion gap aumentado, sem uso de antídoto): manter em observação por 24h, com coleta de exames laboratoriais. Repetir gasometria (com cloro) a cada 4h e todos os exames a cada 8h. Alta sem apresentar piora clínica ou evolução com acidose após 24h de observação.
Casos moderados e graves: sem acidose há mais de 12h sem bicarbonato; 24h em observação após término do tratamento; assintomático e sem disfunção orgânica ou sequelas.
Casos moderados e graves com sequelas: a depender da sua condição clínica, a critério médico. Seguimento dos casos com sequelas com especialistas ambulatoriais, conforme acometimento.
Os pacientes devem ser aconselhados a retornar se sintomas se desenvolverem. Checar notificação do caso: CID T51.1 - Efeito tóxico do metanol.

Reações adversas:
Hipoglicemia, principalmente em crianças e pacientes desnutridos; Depressão respiratória e do SNC;
Flebite local com uso de soluções hiperosmolares por via intravenosa.

Advertências e precauções:
Pacientes com nível de consciência deprimido;
Co-ingestão de outros medicamentos depressores do SNC (por exemplo, opióides, sedativos, antidepressivos, anticonvulsivantes, anti-histamínicos, hipnóticos e relaxantes musculares);
Pacientes em uso de dissulfiram ou metronidazol - podem causar hipotensão e rubor nesses pacientes;
Doença hepática;
Gravidez - o uso de álcool é controverso;
Crianças - as crianças são mais suscetíveis ao desenvolvimento de hipoglicemia durante o tratamento com etanol.

Monitoramento do antídoto etanol: o objetivo da terapêutica visa manter uma etanolemia de 100 a 150 mg/dL (estado de embriaguez leve a moderada).
As concentrações sanguíneas de etanol e glicose devem ser monitoradas a cada 1-2 horas, inicialmente, até atingir a concentração de 100 a 150 mg/dL, e, posteriormente, a cada 2-4 horas. A concentração de etanol deve ser repetida 1 hora após qualquer alteração na taxa.
Na ausência da dosagem de etanolemia, deve ser avaliado o risco-benefício, e a critério médico deve ser considerada a hemodiálise e o tratamento de suporte.

Etanol atua como um inibidor competitivo da enzima álcool desidrogenase, bloqueando a formação de metabólitos tóxicos do metanol, etilenoglicol, dietilenoglicol e butilglicol.
Apresentação: ampolas de 10 ml de álcool absoluto (etanol 100%).
Diluição: Deve ser administrada uma solução injetável de etanol a 10% (administração IV). Para se obter uma solução de etanol a 10% para uso IV deve-se diluir 100 ml de álcool absoluto (10 ampolas de etanol a 100% de 10 mL) em 900 ml de soro glicosado a 5% (SG 5%).
Dose de ataque: infundir 8 mL/kg (800 mg/kg) em 30 a 60 minutos.
Dose de manutenção:
• Não alcoolista: 0,8-1,3 mL/kg/h (80-130 mg/kg/h);
• Tolerante ao álcool (alcoolista): 1,5 mL/kg/h (150 mg/kg/h);
• Hemodiálise: 2,5-3,5 mL/kg/h (250-350 mg/kg/h).

Inibidor competitivo da enzima álcool desidrogenase, bloqueando a formação de metabólitos tóxicos do metanol, etilenoglicol, dietilenoglicol e butilglicol.
Apresentação: ampola de 1,5 ml contendo 1000 mg/mL de fomepizol.
Diluição: uma ampola deve ser diluída em 100 ml de SF 0,9% ou SG 5% (15 mg/ml).
• Dose de ataque: 15 mg/kg IV, infundida em 30 minutos.
• Dose de manutenção: 10 mg/kg a cada 12h por 4 doses.
• Doses adicionais: caso a terapêutica se prolongue por mais de 48h, a dose infundida a cada 12h pode ser aumentada para 15 mg/kg/dose.
• Hemodiálise: Infundir 10 mg/kg a cada 4h.
A administração de fomepizol deve ser mantida até que as concentrações séricas dos álcoois tóxicos sejam insuficientes para determinar toxicidade (< 25 mg/dL).

ABORDAGEM INICIAL:

- Suporte avançado de vida ao paciente;
- A descontaminação gástrica e uso do carvão ativado estão **CONTRAINDICADOS**;
- Monitorização contínua dos sinais vitais;
- Glicemia capilar (seriada se comprometimento neurológico ou se em tratamento com etanol);
- Hidratação suficiente para diurese de 1 a 2 mL/kg/h;
- ECG seriado a cada 8h para pacientes estáveis, e conforme gravidade se instável (atentar para alteração de intervalo QRS QT);
- Avaliação neurológica e oftalmológica;
- Realizar notificação do caso;
- **Discussão do caso com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) local.**

COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS EM CASOS SUSPEITOS:

- Dosar ureia, creatinina, eletrólitos (incluindo cloro), gasometria arterial (com bicarbonato);
- Coleta de amostra para metanol, se disponível (ver Anexo I), após 2h da exposição;
- Calcule o gap osmolar (GO) e o ânion gap (AG).

GO > 10 mOsm com um AG > 12 sugerem a ingestão de metanol.

Atenção! A ausência de acidose metabólica do ânion gap alto não descarta o diagnóstico se a apresentação for precoce. A acidose só se desenvolve depois que parte do metanol foi metabolizado em ácido fórmico.

Medida	Cálculo
Gap osmolar (GO)	Osmolalidade medida - osmolalidade calculada (OC)
Osmolalidade calculada (OC)	$(\text{glicose} \times 1,8) + (\text{uréia} \times 2,8)$
Ânion gap (AG)	$(\text{Na}^+ - \text{Cl}^- - \text{HCO}_3^- - \text{C})$

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS:

- 1) Critério confirmatório (laboratorial):** Detecção/ quantificação de metanol no sangue ou na urina.
E/OU
2) Diagnóstico presuntivo quando a dosagem específica não está disponível: História e clínica compatíveis + 1 dos itens abaixo:
a) Acidose metabólica com ânion gap aumentado ($\text{pH} \leq 7,30$ e/ou $\text{HCO}_3^- \leq 20$ mEq/L, com ânion gap elevado > 12 mEq/L), não justificado por outras causas;
b) Gap Osmolar aumentado — mais útil nas apresentações precoces. Fortemente sugestivo: $\text{GO} > 25$ mOsm/kg. Suspeito: $\text{GO} > 10$ mOsm/kg.

Atenção! GO normal não exclui intoxicação em apresentações tardias.

ANEXO I - DOSAGEM DE METANOL

A coleta de sangue para dosagem de metanol, etanol e ácido fórmico deve ser feita em tubo com tampa cinza, e a antissepsia local somente com degermante não alcóolico.
Na coleta de sangue no tubo com tampa cinza, o sangue coletado deve preencher 75% do volume do tubo, ACIMA da marca indicada, e o frasco homogeneizado levemente por inversão durante 5 vezes.
As amostras devem ser acondicionadas de forma adequada em caixa de transporte com gelo reciclável com controle de temperatura (2 °C a 8 °C) durante o transporte até o laboratório que realizará a análise.

Atenção! Coletar na admissão e manter refrigerado até a análise, pois o metanol é praticamente todo eliminado em até 4 dias.

Caso com sintomas, mas sem acidose ou ânion gap aumentado, sem uso de antídoto: manter em observação por 24h, com coleta de exames laboratoriais. Repetir gasometria (com cloro) a cada 4h e todos os exames a cada 8h.

Se alteração do quadro clínico e exames laboratoriais: rediscutir o caso com o CIATox, avaliar critérios diagnósticos e início de tratamento específico.

Preenche critérios diagnósticos?

Sim

Não

Tratamento sintomático e de suporte

Tratamento específico

Bicarbonato

Hemodiálise

Antídoto